

Caphosol®

Τί είναι το Caphosol®;

Το Caphosol® είναι ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα για την πρόληψη και τη θεραπεία της στοματικής μυκητίασης, γνωστή ως στοματίτιδα μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου της υγείας. Το Caphosol® ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία στη συνήθη φροντίδα του στόματος, με στόχο την πρόληψη και τη θεραπεία της μυκητίασης, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει από τη ραδιοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία. Το Caphosol® ενδείκνυται, επίσης, για το ξερό στόμα και τον στοματοφάρυγγα (υποσιάλωση και ξηροστομία), ανεξάρτητα από την αιτία, ή από τον


αν τα συμπτώματα είναι προσωρινά ή μόνιμα.¹

Το Caphosol® περιέχει μεγάλη συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου και φωσφορικού άλατος. Το ασβέστιο και το φωσφορικό άλας είναι σημαντικά για τη διατήρηση της υγείας της στοματικής κοιλότητας². Το Caphosol® προορίζεται για την ύγρανση, την λίπανση και την καθαριότητα της στοματικής κοιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των στοματικών μυκητιάσεων, της γλώσσας και του στοματοφάρυγγος.¹

Με ποιο τρόπο το Caphosol® καλυτερεύει την στοματική μυκητίαση;

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Caphosol® κατά την θεραπεία της στοματικής μυκητίασης είναι κλινικά αποδεδειγμένη²;

Περισσότεροι από διπλάσιοι ασθενείς απέφυγαν τη στοματική μυκητίαση με τη χρήση του Caphosol®²




Προσαρμοσμένο από τον Papas *et al.*² Στοιχεία μιας διερευνητικής μελέτης, τυχαίοποιημένης, διπλά τυφλής, ελεγχόμενης 95 ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νωτιαίου μυελού.

Απεδείχθη ότι το Caphosol®:

- Μειώνει τη διάρκεια της στοματικής μυκητίασης²
- Μειώνει τη διάρκεια του πόνου που σχετίζεται με τη στοματική μυκητίαση²
- Μειώνει τη χρήση μορφίνης από τους ασθενείς κατά 72%, με σχεδόν τα ¾ να μην χρειάζονται καθόλου μορφίνη²

Ο μέσος όρος ημερών που οι ασθενείς είχαν στοματική μυκητίαση, πόνο και χρησιμοποιούσαν μορφίνη, βελτιώθηκε με το Caphosol®²



Προσαρμοσμένο από τον Papas *et al.*² Στοιχεία μιας διερευνητικής μελέτης, τυχαίοποιημένης, διπλά τυφλής, ελεγχόμενης 95 ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νωτιαίου μυελού.


Μέσω της πρόληψης και της θεραπείας της στοματικής μυκητίασης που σχετίζεται με τις ογκολογικές θεραπείες, μειώνεται ο κίνδυνος διακοπής της ογκολογικής θεραπείας

Με ποιο τρόπο το Carphosol® προλαμβάνει την στοματική μυκητίαση;

Δύο ανοιχτές μελέτες^{3,4} απέδειξαν ότι το Carphosol® έχει μια κλινικά σημαντική επίπτωση στην εκδήλωση και την σοβαρότητα της στοματικής μυκητίασης.

Η πρώτη ήταν μια καταγραφή παρατηρήσεων, που κατέδειξε τα χαμηλά ποσοστά στοματικής μυκητίασης σε αρρώστους που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και ραδιοθεραπεία, με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης στοματικής μυκητίασης, οι οποίοι έκαναν προφυλακτική πλύση με το Carphosol® 4 με 10 φορές την ημέρα.³


Κλινική εξέταση για στοματική μυκητίαση σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και λαιμού, μετά την προφυλακτική λήψη Carphosol®³



Προσαρμοσμένο από τους Haas *et al.*³ Στοιχεία από παρατηρητική καταγραφή ασθενών με πρόβλημα στο κεφάλι ή το λαιμό (n=61) που λάμβαναν χημειο- ή/και ραδιοθεραπεία σε 26 ραδιολογικά/ιατρικά ογκολογικά κέντρα στις ΗΠΑ από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Φεβρουάριο του 2008.

Η δεύτερη μελέτη συμπέρανε ότι το Carphosol® συσχετιζόταν με τη μείωση της εμφάνισης και τη βαρύτητα της στοματικής μυκητίασης, πέραν των μειώσεων των εξόδων της θεραπείας.⁴

Εμφάνιση και σοβαρότητα της στοματικής μυκητίασης⁴



Προσαρμοσμένο από τους Miyamoto C *et al.*⁴ Μία αναδρομική μελέτη σε 21 ασθενείς με καρκίνο στο κεφάλι ή το λαιμό που θεραπεύονταν με ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (MRT) που λάμβαναν Carphosol® από την αρχή της θεραπείας τους. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά 21 ασθενών που λάμβαναν κλασική φροντίδα για τη στοματική μυκητίαση.

- Το Carphosol® μειώνει την ανάγκη χρήσεως οισοφαγικού καθετήρα για τη διοχέτευση της τροφής⁴
- Το Carphosol® μειώνει την ανάγκη της εισαγωγής στο νοσοκομείο εξαιτίας της στοματικής μυκητίασης⁴
- Το Carphosol® μειώνει το κόστος της θεραπείας που αφορά στην στοματική μυκητίαση κατά 54–68%, ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του κόστους της θεραπείας⁴

Με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται το Carphosol®;

Το Carphosol® μπορεί εύκολα να περιληφθεί στη συνολική ογκολογική θεραπεία

- Πολύ εύκολο στη χρήση, αποτελείται από δύο αμπούλες διαφορετικών χρωμάτων¹
 - Η μια αμπούλα περιέχει ιόντα φωσφορικού άλατος και η άλλη ιόντα ασβεστίου.
- Καλά ανεκτό²
- Δοσολογία ευέλικτη, από 4 έως 10 φορές την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή¹

Μερικά απλά βήματα για την σωστή χρήση του Carphosol®¹

1 Ανακατέψτε το περιεχόμενο των δύο αμποουλών σε ένα ποτήρι *



2 Κάντε γαργάρες με τη μισή ποσότητα του υγρού για ένα λεπτό τουλάχιστον



3 Φτύστε το υγρό



4 Κάντε και πάλι γαργάρες για ένα λεπτό τουλάχιστον με το υπόλοιπο



5 Φτύστε το υγρό



*Δεν είναι ανάγκη οι αμπούλες να αναμειγνύονται ταυτόχρονα στο ποτήρι

Βιβλιογραφία:

1. Carphosol® Product information. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008. **2.** Papas AS *et al.* *Bone Marrow Transplant* 2003;**31**:705–712. **3.** Haas M *et al.* 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. **4.** Miyamoto C *et al.* *Support Care Cancer* 2009;**17**:857–1039.