


# Ένα καλύτερο στόμα με το Caphosol®†



Η καθημερινή χρήση του στοματικού διαλύματος Caphosol® πριν και κατά τη διάρκεια της ογκολογικής θεραπείας βοηθά στην πρόληψη της στοματικής μυκητίασης και προβαίνει στη θεραπεία της σε περίπτωση που έχει ήδη εκδηλωθεί.

Caphosol®	
<b>Τι είναι;</b>	<p>Το Caphosol® είναι ένα στοματικό διάλυμα πλούσιο σε ιόντα ασβεστίου και φωσφορικού άλατος. Ενεργεί μέσω της λίπανσης του στόματος κάνοντας πιο εύκολη την κατάποση των τροφίμων<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Το Caphosol® είναι το μοναδικό στοματικό διάλυμα, αποδεδειγμένο επιστημονικά, που βοηθά στην πρόληψη και την μείωση της διάρκειας και του πόνου της στοματικής μυκητίασης<sup>1,2</sup></li><li>• Η χρήση του Caphosol® πριν το ξεκίνημα της ογκολογικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της σοβαρότητας της στοματικής μυκητίασης ή στην πρόληψη της εμφάνισής της<sup>1</sup></li></ul>
<b>Με τι συχνότητα θα πρέπει να το χρησιμοποιώ;</b>	Στην αρχή της ογκολογικής θεραπείας πρέπει να χρησιμοποιείτε το Caphosol® από 4 έως 10 φορές την ημέρα, σε περίπτωση που ο πόνος χειροτερέψει.
<b>Έχει παρενέργειες;</b>	Οι παρενέργειες που αναφέρονται από τη χρήση του Caphosol® ήταν σπάνιες και σε γενικές γραμμές ελαφριές
<b>Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που καταπιώ τυχαία Caphosol®;</b>	Μην ανησυχείτε. Δεν προβλέπονται δυσμενείς επιπτώσεις σε περίπτωση που καταπιείτε τυχαία Caphosol® <sup>3</sup>
<b>Μπορώ να φάω αμέσως μετά τη χρήση του Caphosol®;</b>	Πρέπει να αποφύγετε το φαγητό και το ποτό τουλάχιστον για τα επόμενα 15 λεπτά, αφού κάνετε γαργάρες με Caphosol®
<b>Παράγω περισσότερο σάλιο αν χρησιμοποιήσω το Caphosol®;</b>	Όχι, το Caphosol® δεν αυξάνει την παραγωγή σάλιου
<b>Πώς μπορώ να το αποκτήσω;</b>	Ζητείστε από τον ιατρό σας ή τη νοσοκόμα μια συνταγή με το Caphosol® ή αγοράστε το από το διαδίκτυο αν είναι διαθέσιμο. Για να παραγγείλετε το Caphosol® επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <a href="http://www.caphosol.eu">www.caphosol.eu</a> .

Το Caphosol® ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία στις συνήθεις στοματικές αγωγές στην πρόληψη και τη θεραπεία της μυκητίασης, που είναι δυνατόν να προκληθεί από τη ραδιοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Caphosol® επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: [http://www.caphosol.eu/product\\_info\\_hcp.asp](http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp)

**mouths made good.com**

For any pharmacovigilance or medical information requests about Caphosol®, please contact us at [informed@eusapharma.com](mailto:informed@eusapharma.com)

## Caphosol®

### Πώς πρέπει να χρησιμοποιώ το Caphosol;

Το Caphosol® είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Αποτελείται από δύο αμπούλες διαφορετικού χρώματος που θα πρέπει να αναμιξέτε πριν κάνετε γαργάρες<sup>3</sup>

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Caphosol® ταυτόχρονα με άλλες θεραπείες, δεδομένου ότι δεν έχουμε γνώση αλληλεπίδρασης του Caphosol® με άλλες θεραπείες<sup>3</sup>
- Το Caphosol® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 4 έως 10 φορές την ημέρα, ανάλογα με την κατάσταση του στόματός σας<sup>3</sup>
- Θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση άλλων στοματικών διαλυμάτων, να μην τρώτε και να μην πίνετε για τα επόμενα 15 λεπτά τουλάχιστον, αφού κάνετε γαργάρες με Caphosol®<sup>3</sup>

**1** Ανακατέψτε το περιεχόμενο των δύο αμποουλών σε ένα ποτήρι\*



**2** Κάντε γαργάρες με τη μισή ποσότητα του υγρού για ένα λεπτό τουλάχιστον



**3** Φτύστε το προϊόν



**4** Κάντε και πάλι γαργάρες με το άλλο μισό του προϊόντος για ένα ακόμα λεπτό, τουλάχιστον



**5** Φτύστε το προϊόν και τελειώσατε



\*Δεν είναι ανάγκη οι αμπούλες να αναμειγνύονται ταυτόχρονα στο ποτήρι

Για περισσότερες πληροφορίες για την στοματική μυκητίαση και τον έλεγχό της, επικοινωνήστε με τον ιατρό ή το νοσοκόμο σας και διαβάστε τα υπόλοιπα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα: [www.mouthsmadegood.com](http://www.mouthsmadegood.com)

#### Bibliografia:

1. Papas AS et al. *Bone Marrow Transplant* 2003;31:705—712. 2. Haas M et al. 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. 3. Caphosol® IFU. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008.