


Una boca mejor



con Caphosol®†

Utilizar diariamente Caphosol® colutorio antes y durante el tratamiento oncológico ayuda a prevenir la mucositis oral y la trata en caso de que ésta ya se haya manifestado.

Caphosol®	
¿Qué es?	<p>Caphosol® es un colutorio rico en iones de calcio y fosfato. Actúa a través de la lubricación de la boca y hace que los alimentos sean más fáciles de tragar¹</p> <ul style="list-style-type: none">• Caphosol® es el único colutorio que está científicamente probado que ayuda a prevenir y a reducir la duración y el dolor de la mucositis oral^{1,2}• Utilizando Caphosol® antes de iniciar el tratamiento oncológico puede reducir la gravedad de la mucositis oral o prevenir su aparición.¹
¿Con qué frecuencia debo utilizarlo?	Al inicio del tratamiento oncológico debe utilizar Caphosol® de 4 a 10 veces al día, se el dolor empeora.
¿Tiene efectos secundarios?	Los efectos secundarios referidos al uso de Caphosol® fueron raros y generalmente leves.
¿Qué debo hacer en caso de ingestión accidental de Caphosol?	No se preocupe. No se espera que se produzca ningún efecto secundario si ingiere accidentalmente Caphosol®. ³
¿Puedo comer nada más utilizar Caphosol?	Debe evitar comer y beber durante al menos 15 minutos tras enjuagarse con Caphosol®.
¿Produciré más saliva al utilizar Caphosol?	No, Caphosol® no estimula la producción de saliva.
¿Dónde puedo conseguirlo?	Pida a su médico o enfermera una receta de Caphosol® o cómprelo online si está disponible. Para encargar Caphosol® visite la web www.caphosol.eu .

†† Caphosol® está indicado como adyuvante de los cuidados orales estándar, en la prevención y tratamiento de la mucositis, que puede estar causada por la radioterapia o quimioterapia.

Para más información sobre Caphosol® visite la página web http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp

Caphosol®

¿Cómo debo utilizar Caphosol?

Caphosol® es muy fácil de utilizar. Se presenta en dos ampollas de colores diferentes, que debe mezclar antes de enjuagarse³

- Puede utilizar Caphosol® al mismo tiempo que utiliza otros tratamientos, dado que no se ha descrito ninguna interacción de Caphosol® con otros tratamientos³
- Caphosol® se puede utilizar entre 4 y 10 veces al día, en función del estado de su boca³
- Debe evitar utilizar otros colutorios, comer y beber durante al menos 15 minutos tras el enjuague con Caphosol®³

1 Mezcle el contenido de las dos ampollas en un vaso*



2 Enjuáguese con la mitad del líquido durante al menos un minuto



3 Escupa el producto



4 Enjuáguese de nuevo con la otra mitad del producto, al menos otro minuto más



5 Escupa el producto y ya está



*Las ampollas no se deben poner a la vez en un vaso.

Para más información sobre la mucositis oral y su control, hable con su médico o enfermera y lea otras hojas de resumen de datos disponibles en la web www.mouthsmadegood.com

Bibliografía:

1. Papas AS *et al.* *Bone Marrow Transplant* 2003;31:705–712. 2. Haas M *et al.* 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. 3. Caphosol® IFU. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008.