


Mucite buccale et Caphosol®⁺



L'utilisation de Caphosol® dès le début du traitement anticancéreux et pendant toute la durée de celui-ci aide à prévenir l'apparition de la mucite buccale et permet aussi de la traiter si elle est déjà présente.

Caphosol®	
Qu'est-ce que c'est ?	Caphosol® est une solution sursaturée en ions calcium et phosphate. Caphosol® contribue à hydrater, lubrifier et nettoyer la cavité buccale et à maintenir l'intégrité de la muqueuse pour prévenir et traiter la mucite causée par les traitements anticancéreux. ¹ Caphosol® est la seule solution dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée lors d'un essai clinique en réduisant le risque survenue de la mucite, sa durée, ainsi que la douleur associée.
Quand et comment l'utiliser ?	Dès le début du traitement anticancéreux, utiliser Caphosol® au minimum 4 fois par jour et jusqu'à 10 fois par jour si la douleur ou les symptômes apparaissent ou s'aggravent.
Caphosol® a-t-il des effets secondaires ?	Caphosol® est bien toléré. Les effets indésirables rapportés avec Caphosol sont rares et pour la plupart sans gravité.
Que se passe-t-il si j'avale accidentellement Caphosol® ?	Caphosol® ne doit pas être avalé. Toutefois, en cas d'ingestion accidentelle, aucun d'effet indésirable n'est attendu.
Puis-je manger ou boire tout de suite après avoir utilisé Caphosol® ?	Évitez de manger ou boire pendant au moins 15 minutes après chaque bain de bouche avec Caphosol®.
Caphosol® augmente-t-il la production de salive ?	Non, Caphosol® ne stimule pas la production de salive.

¹Caphosol est indiqué comme adjuvant aux traitements standards d'hygiène buccale pour la prévention et le traitement de la mucite causée par une radiothérapie ou une chimiothérapie à haute dose. Pour plus d'information que Caphosol®, visitez www.caphosol.fr

Caphosol®

Comment utiliser Caphosol®?

Caphosol® est très simple à utiliser et se présente sous la forme de deux récipients unidoses, l'un bleu, l'autre transparent. Il suffit simplement de mélanger dans un verre propre leur contenu puis d'effectuer le bain de bouche.³

- Ne pas mélanger Caphosol® avec d'autres produits ou de ne pas le diluer avec de l'eau pour qu'il conserve toute son efficacité.³
- Ne pas utiliser d'autres traitements et ne pas manger ou boire pendant au moins 15 minutes après l'utilisation Caphosol®.³
- Utilisez Caphosol® dès le début du traitement anticancéreux, au minimum 4 fois par jour et jusqu'à 10 fois par jour si la douleur ou les symptômes apparaissent ou s'aggravent, demandez conseil à votre médecin.³

1 Mélanger le contenu des 2 récipients



2 Effectuer un bain de bouche pendant une minute avec la moitié du verre



3 Recracher



4 Effectuer un deuxième bain de bouche pendant une minute avec l'autre moitié du verre



5 Recracher. C'est tout !



Pour plus d'informations sur comment prévenir et traiter la mucite buccale, consultez votre médecin ou votre infirmier(ère). Vous pouvez aussi lire les autres documents disponibles sur notre site www.mouthsmadegood.com

1 boîte contient 1x30 ou 4x30 doses de traitement.

1 dose de traitement = 2 récipients unidoses de 15 ml chacun, mélangés ensemble.

Forme pharmaceutique :

Solution pour bain de bouche. Solution aqueuse. Caphosol® est une préparation composée de deux solutions aqueuses sous conditionnements séparés, une solution de phosphate (Caphosol® A) et une solution de calcium (Caphosol® B). Lorsque les deux solutions sont mélangées à volume égal, elles forment une solution sursaturée à la fois en ions calcium et en ions phosphate.

Ingrédients :


0,032 d'hydrogénophosphate de sodium, 0,009 de dihydrogénophosphate de sodium, 0,052 de chlorure de calcium, 0,569 de chlorure de sodium, eau purifiée qs (%m/m).

Actions :

Caphosol® est une solution électrolytique conçue pour hydrater, lubrifier et nettoyer la cavité buccale, y compris les muqueuses de la bouche, de la langue et de l'oropharynx.

Indications :

Sécheresse de la bouche et de l'oropharynx (hyposalivation, xérostomie), quelles qu'en soient la cause et la durée, temporaire ou permanente. Caphosol® est notamment indiqué comme adjuvant aux traitements standards d'hygiène buccale pour la prévention et le traitement de la mucite causée par une radiothérapie ou une chimiothérapie à haute dose. Le soulagement de la sécheresse de la muqueuse buccale dans ces conditions est associé à une diminution de la douleur.



Mode d'administration :

- 1) Mélanger 1 récipient unidosé bleu (Caphosol® A) et 1 récipient unidosé transparent (Caphosol® B) dans un verre propre.
- 2) Rincer la bouche soigneusement pendant 1 minute avec la moitié de la solution et recracher.
- 3) Répéter avec le reste de la solution et recracher.

Utiliser immédiatement après avoir mélangé les deux récipients unidoses.

Posologie :

4 à 10 bains de bouche par jour. Utiliser pour la durée du traitement ou selon les instructions du médecin.

Interactions avec d'autres traitements :

Il n'y a pas d'interaction connue avec d'autres médicaments ou produits.

Précautions particulières d'emploi :

Évitez de manger ou boire pendant au moins 15 minutes après utilisation. Ne pas utiliser le récipient unidosé s'il n'est plus scellé ou s'il présente des signes de fuite ou de dommage. Contient du sodium (71 mg par dose de traitement de 30 ml). Les patients suivant un régime alimentaire pauvre en sodium doivent consulter leur médecin avant utilisation. Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas congeler.

Aucun effet indésirable n'est attendu si Caphosol® est avalé accidentellement.

References:

1. Papas AS *et al.* *Bone Marrow Transplant* 2003;31:705—712. 2. Haas M *et al.* 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. 3. Caphosol® IFU. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008.