


# Una bocca migliore con Caphosol®†



Utilizzare quotidianamente Caphosol® collutorio prima e durante il trattamento oncologico aiuta a prevenire la mucosite orale e la cura quando si è già manifestata.

Caphosol®	
<b>Che cos'è?</b>	<p>Caphosol® è un collutorio ricco di ioni calcio e fosfato. Agisce attraverso la lubrificazione della bocca e rende gli alimenti più facili da ingoiare<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Caphosol® è l'unico collutorio scientificamente testato che aiuta a prevenire e ridurre la durata e il dolore della mucosite orale<sup>1,2</sup></li><li>• Utilizzare Caphosol® prima di iniziare il trattamento oncologico può ridurre la gravità della mucosite orale o prevenirne l'insorgenza<sup>1</sup></li></ul>
<b>Con che frequenza devo utilizzarlo?</b>	All'inizio del trattamento oncologico Caphosol® va utilizzato tra le 4 e le 10 volte al giorno, se il dolore dovesse aggravarsi
<b>Ha effetti secondari?</b>	Gli effetti secondari verificati con l'uso di Caphosol® sono stati rari e generalmente leggeri
<b>Che cosa devo fare se ingoio accidentalmente</b>	Non si preoccupi. Non è prevista l'insorgenza di nessun effetto pericoloso in caso di ingestione accidentale di Caphosol® <sup>3</sup>
<b>Posso mangiare subito dopo aver</b>	Si dovrà evitare di ingerire cibi e liquidi per almeno 15 minuti dopo gli sciacqui con Caphosol®
<b>Produco più saliva se utilizzo</b>	No, Caphosol® non stimola la produzione di saliva
<b>Dove posso ottenerlo?</b>	Chieda al suo medico o all'infermiera una ricetta di Caphosol® oppure lo acquisti online qualora sia disponibile. Per ordinare Caphosol® basta andare sul sito <a href="http://www.caphosol.eu">www.caphosol.eu</a> .

†Caphosol® è indicato come coadiuvante nelle cure orali standard, per la prevenzione e il trattamento della mucosite che può essere provocata da radioterapia o chemioterapia.

Per ulteriori informazioni su Caphosol® basta andare sul sito [http://www.caphosol.eu/product\\_info\\_hcp.asp](http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp)

## Caphosol®

### Come devo utilizzare Caphosol®?

Caphosol® è molto facile da usare. Si presenta in due fiale di colori diversi, che vanno miscelate prima degli sciacqui<sup>3</sup>

- Caphosol® può essere utilizzato contemporaneamente ad altri trattamenti, giacché non è nota alcuna interferenza di Caphosol® con altre terapie<sup>3</sup>
- Caphosol® può essere usato tra le 4 e le 10 volte al giorno, a seconda dello stato della bocca<sup>3</sup>
- Sono da evitare l'uso di altri colluttori e l'ingestione di cibi e liquidi per almeno 15 minuti dopo gli sciacqui con Caphosol®<sup>3</sup>

**1** Miscelare il contenuto delle due fiale in un bicchiere\*



**2** Fare sciacqui con metà del liquido per almeno un minuto



**3** Sputare il prodotto



**4** Fare sciacqui nuovamente con l'altra metà del prodotto, per almeno un altro minuto



**5** Sputare il liquido ed ecco fatto!



\*Le fiale non devono essere versate nel bicchiere contemporaneamente.

Per ulteriori informazioni sulla mucosite orale e su come controllarla, parlare con il medico o l'infermiera e leggere gli altri fogli di sintesi dei dati disponibili sul sito [www.mouthsmadegood.com](http://www.mouthsmadegood.com)

#### Bibliografia:

1. Papas AS et al. *Bone Marrow Transplant* 2003;31:705–712. 2. Haas M et al. 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. 3. Caphosol® IFU. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008.