


Pozytywny wpływ preparatu



Caphosol®†

Codziennie przepłukiwanie ust preparatem Caphosol® przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego i w jego trakcie przyczynia się do zapobieżenia wystąpieniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i łagodzi objawy istniejącego zapalenia.

Caphosol®	
Co to jest?	Preparat Caphosol® to płyn do przepłukiwania ust bogaty w jony wapnia i fosforanu. Preparat nawilża usta i ułatwia przelknięcie pokarmów ¹ <ul style="list-style-type: none">• Caphosol® to jedyny płyn do przepłukiwania ust o dowiedzonej naukowo skuteczności w zapobieganiu zapaleniu błony śluzowej jamy, skracaniu czasu utrzymywania się tego stanu i uśmierzaniu związanego z nim bólu^{1,2}• Zastosowanie preparatu Caphosol® przed rozpoczęciem terapii onkologicznej może zmniejszyć nasilenie zapalenia błony śluzowej jamy, a nawet całkowicie zapobiec wystąpieniu tego stanu¹
Jak często należy stosować preparat?	Na początku terapii onkologicznej preparat stosować należy 4 razy dziennie, a nawet 10 razy jeśli ból nasila się
Czy preparat wywołuje skutki uboczne?	Udokumentowane skutki uboczne występowały rzadko i miały generalnie łagodny charakter
Co zrobić w razie przypadkowego połknięcia preparatu?	Nie martwić się. Uważa się, że przypadkowe połknięcie preparatu Caphosol® jest nieszkodliwe ³
Czy można jeść bezpośrednio po użyciu preparatu?	Należy unikać jedzenia i picia przez co najmniej 15 minut od przepłukania jamy ustnej preparatem
Czy preparat pobudza wydzielanie śliny?	Nie. Caphosol® nie pobudza wydzielania śliny
Gdzie można go nabyć?	Należy poprosić lekarza lub personel pielęgniarski o receptę lub zakupić Caphosol® za pośrednictwem Internetu (jeśli jest dostępny). Preparat zamówić można na stronie www.caphosol.eu

† Preparat Caphosol® wskazany jest do stosowania jako uzupełnienie standardowych środków higieny jamy ustnej w zapobieganiu i leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanego radio- lub chemioterapią. Dodatkowe informacje o preparacie: http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp

Caphosol®

Jak stosować preparat?

Caphosol® jest bardzo łatwy w użyciu. Preparat zawarty jest w dwóch ampułkach oznaczonych różnymi kolorami. Zawartość ampulek należy wymieszać przed rozpoczęciem płukania jamy ustnej³

- Caphosol® stosować można równolegle z innymi lekami, ponieważ nie są znane żadne interakcje tego preparatu z innymi terapiami³
- Caphosol® stosować można od 4 do 10 razy dziennie w zależności od stanu jamy ustnej³
- Należy unikać stosowania innych płynów do płukania ust, a także jedzenia i picia przez co najmniej 15 minut od przepłukania jamy ustnej preparatem Caphosol®³

1 Zmieszać zawartość obydwu ampulek w szklance lub kubku*



2 Przepłukiwać jamę ustną połową płynu przez pełną minutę



3 Wypluć preparat



4 Przepłukiwać jamę ustną drugą połową płynu przez pełną minutę



5 Wypluć preparat. Płukanie zostało zakończone!



* Zawartość ampulek nie musi zostać włana do naczynia jednocześnie.

Informacji o leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i zapobiegania temu stanowi udzielić może lekarz lub personel pielęgniarski. Dostępne są one również na stronie www.mouthsmadegood.com

Źródła:

1. Papas AS *et al.* *Bone Marrow Transplant* 2003;**31**:705-712. 2. Haas M *et al.* 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. 3. Caphosol® IFU. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008.