


# Uma boca melhor com Caphosol<sup>®†</sup>



Utilizar diariamente Caphosol<sup>®</sup> solução antes e durante o tratamento oncológico ajuda a prevenir a mucosite oral e trata-a caso esta já se tenha manifestado.

Caphosol <sup>®</sup>	
<b>O que é?</b>	<p>Caphosol<sup>®</sup> é uma solução rica em iões de fosfato e cálcio. Actua através da lubrificação da boca e torna os alimentos mais fáceis de engolir<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Caphosol<sup>®</sup> é o única solução que está cientificamente provada que ajuda a prevenir e a reduzir a duração e a dor da mucosite oral.<sup>1,2</sup></li><li>• Utilizando Caphosol<sup>®</sup> antes de iniciar o tratamento oncológico pode reduzir a gravidade da mucosite oral ou prevenir a sua ocorrência<sup>1</sup></li></ul>
<b>Com que frequência devo utilizá-lo?</b>	No início do tratamento oncológico deve utilizar Caphosol <sup>®</sup> de 4 até 10 vezes por dia, se a dor se agravar.
<b>Tem efeitos secundários?</b>	Os efeitos secundários referidos com o uso de Caphosol <sup>®</sup> foram raros e geralmente ligeiros.
<b>O que devo fazer se engolir acidentalmente Caphosol?</b>	Não se preocupe. Não se espera a ocorrência de quaisquer efeitos adversos se engolir acidentalmente Caphosol <sup>®</sup> . <sup>3</sup>
<b>Posso comer logo depois de utilizar Caphosol?</b>	Deve evitar comer e beber durante pelo menos 15 minutos depois de bochechar com Caphosol <sup>®</sup>
<b>Produzo mais saliva se utilizar Caphosol?</b>	Não, Caphosol <sup>®</sup> não estimula a produção de saliva.
<b>Onde posso obtê-lo?</b>	Peça ao seu médico ou enfermeira uma receita de Caphosol <sup>®</sup> ou compre-o online se estiver disponível. Para encomendar Caphosol <sup>®</sup> visite o site <a href="http://www.caphosol.eu">www.caphosol.eu</a> .

<sup>†</sup>Caphosol<sup>®</sup> está indicado como adjuvante dos cuidados orais padrão, na prevenção e tratamento da mucosite, que pode ser causada pela radioterapia ou quimioterapia. Para mais informações sobre Caphosol<sup>®</sup> visite o site [http://www.caphosol.eu/product\\_info\\_hcp.asp](http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp)

[mouthsmadegood.com](http://mouthsmadegood.com)

Para solicitar dados de farmacovigilância ou informações de carácter médico relativas a Caphosol<sup>®</sup>, contacte-nos em [informed@eusapharma.com](mailto:informed@eusapharma.com)

## Caphosol®

### Como devo utilizar Caphosol®?

Caphosol® é muito fácil de utilizar. É apresentado em duas ampolas de cores diferentes, que deve misturar antes de bochechar<sup>3</sup>

- Pode utilizar Caphosol® ao mesmo tempo que faz outros tratamentos, dado não se conhecerem quaisquer interações de Caphosol® com outras terapêuticas<sup>3</sup>
- Caphosol® pode ser utilizado entre 4 e 10 vezes por dia, em função do estado da sua boca<sup>3</sup>
- Deve evitar utilizar outros colutórios, comer e beber durante pelo menos 15 minutos depois de bochechar com Caphosol®<sup>3</sup>

**1** Misture o conteúdo das duas ampolas num copo\*



**2** Bocheche com metade do líquido durante pelo menos um minuto



**3** Cuspa o produto



**4** Bocheche de novo com a outra metade do produto, pelo menos mais um minuto



**5** Cuspa o produto e já está!



\*As ampolas não têm de ser deitadas em simultâneo num copo.

Para mais informações sobre a mucosite oral e o seu controlo, fale com o seu médico ou enfermeira e leia as outras folhas de resumo de dados disponíveis no site [www.mouthsmadegood.com](http://www.mouthsmadegood.com)

#### Bibliografia:

1. Papas AS *et al.* *Bone Marrow Transplant* 2003;31:705–712. 2. Haas M *et al.* 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. 3. Caphosol® IFU. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008.

[mouthsmadegood.com](http://mouthsmadegood.com)

Para solicitar dados de farmacovigilância ou informações de carácter médico relativas a Caphosol®, contacte-nos em [informed@eusapharma.com](mailto:informed@eusapharma.com)

Data de referência: Novembro de 2009.

CAP/EUR/053/1109-01